

## 劇薬

動物用医薬品 解熱・鎮痛・抗アレルギー剤

## ネオアス注射液 NEOAS INJECTION

本剤は、解熱・鎮痛・消炎剤、呼吸器官用剤及び抗ヒスタミン剤を配合した注射剤で、気管支拡張作用及び抗アレルギー作用により、諸症状を総合的に改善する。

## 【組成】

本剤は100mL中に下記成分を含有する。

スルピリン水和物	20,000mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	2,000mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	100mg

## 【効能又は効果】

牛・馬・豚・犬・猫：感冒、肺炎、気管支炎等の解熱、鎮痛、鎮咳、去痰

## 【用法及び用量】

1 回体重1kg当たり、下記量を1日1～3回皮下、筋肉内又は静脈内に注射する。

牛・馬・豚・犬・猫：0.02～0.05mL

## 【使用上の注意】

## [一般的注意]

- 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。
- 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- 本剤投与後、下記の期間は食用に供する目的で出荷等を行わないこと。  
牛・馬・豚：10日間 牛乳：36時間
- 本剤は獣医師の指導の下で使用すること。

## [使用者に対する注意]

- 誤って注射された者は、直ちに医師の診察を受けること。

## [対象動物に対する注意]

## 1. 制限事項

(1) 本剤は、肝、腎、血液に障害を有する動物に使用する場合には慎重に使用すること。

## 2. 副作用

(1) 本剤の有効成分であるスルピリン水和物は、実験動物で変異原性及び催奇形作用が認められているので、使用に当たっては慎重を期すこと。

## 3. 適用上の注意

- 注射器具は滅菌されたものを使用すること。
- 本剤を静脈内に注射する場合には、血圧低下を起こすことがあるので、できるだけ緩徐に注入すること。
- 本剤は、筋肉内又は皮下に注射した場合、局所に硬結、神経麻ひを起こすことがあるので慎重に投与すること。
- 本剤をサルファ剤の注射液と混合した場合、結晶が析出することがあるので混合しないこと。

## [取扱い上の注意]

- 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 使用済みの注射針は、針回収用の専用容器に入れること。針回収用の容器の廃棄は、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可を有した業者に委託すること。

## [保管上の注意]

- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。
- 0℃以下で長期間（2～3箇月）保存すると結晶が析出する場合があるので注意すること。

## 【薬理作用】

### 1. スルピリン水和物

解熱・鎮痛・消炎作用を有するピラゾロン化合物でその解熱作用はアンチピリンの3倍、アミノピリンと同程度といわれている。

### 2. dl-メチルエフェドリン塩酸塩

気管支拡張作用、鎮咳作用及び抗アレルギー作用を有する。

### 3. クロルフェニラミンマレイン酸塩

強力な抗ヒスタミン作用を有し気管の分泌を減じ、血管収縮作用を有する。

## 【包装】

100mL×10バイアル

## 【参考文献】

- 1) 「牛の呼吸器系及び非呼吸器系疾患に対するネオアス注射液の臨床試験」  
大竹 修 他：家畜診療 第352号, 35 (1992年10月)
- 2) 「豚の呼吸器系及び非呼吸器系疾患に対するネオアス注射液の治療試験」  
山本輝次 他：家畜診療 第353号, 29 (1992年11月)

## 【文献請求先】

東亜薬品工業株式会社 動薬開発部  
〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2丁目1番11号  
Tel 03 (3375) 0511

製造販売元



**東亜薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区笹塚2丁目1番11号